

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE FESTUCA

| | |
|--|----------------------------|
| Especie: | festuca |
| Nombre científico: | <i>Festuca arundinacea</i> |
| Peso máximo de lote (kg): | 10.000 |
| Peso mínimo de las muestras: | |
| Muestra remitida (g): | 300 |
| Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g): | 5 |
| Muestra de trabajo para determinación en N° de otras semillas (g): | 50 |

| Parámetros | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Campo | Niveles de tolerancia | | | |
| | Prebásica - Básica | Certificada (C1 y C2) | Comercial A (6) | Comercial B (6) |
| Rotación (Ciclos agrícolas sin cultivo de Festuca, Dactylis, Falaris, Raigrás y Festulolium) | | 3 (C1) y 2 (C2) | 2 | |
| Aislamiento (1) (metros) | 100 | 100 (C1) y 50 (C2) | 50 | |
| Plantas fuera de tipo / 10m ² | 1 | 1 (C1) y 10 (C2) | 10 | |
| Plantas de raigrás (2) / 10m ² | 1 | 1 (C1) | | |
| Número mínimo de inspecciones | 1 | 1 | 1 | |
| Laboratorio | | | | |
| Semilla pura (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Materia inerte (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Otras semillas (3) (%) | 1 | 1 (C1) y 4 (C2) | 4 | 4 |
| N° de semillas de malezas con tolerancia (4) / muestra | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Germinación (%) | 75 (5) | 75 | 75 | 75 |

Observaciones:

(1) Se podrá tener en cuenta otras opciones de aislamiento como: remoción de bordes hasta lograr la distancia requerida desde la fuente de contaminación, etc.

(2) En las inspecciones de campo se observará, además, la presencia y frecuencia de falaris, dactylis y bromus a fin de hacer las recomendaciones correspondientes.

Se consideran malezas de tolerancia cero para todas las especies: abrojo (*Xanthium* spp.), capinannoni (*Eragrostis plana*), cuscuta (*Cuscuta* spp.), margarita de piriá (*Coleostephus myconis*), senecio (*Senecio madagascariensis*), sorgo de alepo (*Sorghum halepense*).

(3) Se aceptará como máximo 0.5 % de malezas totales para todas las categorías.

(4) **Se consideran malezas toleradas para festuca:** alpistillo (*Phalaris paradoxa*), biznaga (*Ammi visnaga*), biznaguilla (*Ammi majus*), cardos (*Carduus* spp., *Cynara cardunculus*, *Sylibum marianum*, *Carthamus lanatus*, *Cirsium vulgare*, *Centaurea* spp.), corrigüela (*Convolvulus arvensis*), enredadera negra (*Fallopia convolvulus*), flor morada (*Echium plantagineum*), lengua de vaca (*Rumex* spp.), llantén (*Plantago lanceolata*), pasto bolita (*Cyperus rotundus*).

(5) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización de INASE.

(6) Se podrá comercializar semillas de las categorías Comercial A y B hasta el 31 de diciembre de 2018.