

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE AVENA

| | |
|--|-----------------------|
| Especie: | avena |
| Nombre científico : | * <i>Avena sativa</i> |
| Peso máximo de lote (kgs.): | 30.000 |
| Peso mínimo de las muestras: | |
| Muestra remitida (g): | 1.500 |
| Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g): | 120 |
| Muestra de trabajo para determinación de otras semillas (g): | 1.000 |

| Campo | Niveles de tolerancia por categoría | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Parámetros | Pre Básica - Básica | Certificada (C1 y C2) |
| Rotación (Ciclos agrícolas sin cultivo de cereales de invierno) | | 1 | 1 |
| Panojas fuera de tipo/ 1.000 panojas | | 1 | 3 (C1) y 5 (C2) |
| Espigas y/o panojas de otros cultivos (1) / 1.000 panojas | | 0.2 | 0.2 (C1) |
| Balango y formas fatuoides (Nº) / 1.000 panojas | | 0.1 | 0.1 (C1) y 1 (C2) |
| Número mínimo de inspecciones | | 1 | 1 |
| Laboratorio | | | |
| Semilla pura (%) | | 98 | 98 |
| Materia inerte (%) | | 2 | 2 |
| Otras semillas (%) | | 1 | 1 |
| Semillas de otros cultivos (2) / muestra | | 15 | 15 (C1) |
| Semillas de malezas con tolerancia (3) / muestra (excepto balango) | | 10 | 10 |
| Semillas de raigrás (Nº) / muestra | | 15 | 15 (C1) y 125 (C2) |
| Semillas de balango y formas fatuoides / muestra | | 4 | 4 (C1) y 40 (C2) |
| Germinación (%) | | 85 (4) | 85 |

Observaciones:

(1) Se permitirá la siembra de la misma especie, variedad y de una categoría inferior durante dos ciclos agrícolas seguidos.

Aislación: Distancia suficiente como para evitar mezclas varietales en siembra y cosecha.

(2) **Otros cultivos para avena son:** avena negra (*Avena strigosa*), cebada (*Hordeum vulgare*), cebadilla (*Bromus catharticus*), centeno (*Secale cereale*), trigo (*Triticum aestivum*), trigo candeal (*Triticum durum*), triticale (*X Triticosecale*).

Se consideran malezas de tolerancia cero para todas las especies: abrojo (*Xanthium* spp.), capin annoni (*Eragrostis plana*), cúscuta (*Cuscuta* spp.), margarita de piria (*Coleostephus myconis*), senecio (*Senecio madagascariensis*), sorgo de alepo (*Sorghum halepense*).

(3) **Se consideran malezas toleradas para todas las especies de cultivos de invierno:** alpistillo (*Phalaris paradoxa*), apio cimarrón (*Cycloperum leptophyllum*), balango (*Avena fatua*), biznaga (*Ammi visnaga*), biznaguilla (*Ammi majus*), cardos (*Carduus* spp., *Cynara cardunculus*, *Sylibum marianum*, *Carthamus lanatus*, *Cirsium vulgare*, *Centaurea* spp.), corrigüela (*Convolvulus* spp.), enredadera negra (*Fallopia convolvulus*), flor morada (*Echium plantagineum*), joyo (*Lolium temulentum*), lengua de vaca (*Rumex* spp.), llantén (*Plantago lanceolata*), manzanilla (*Anthemis cotula*), mostacilla (*Rapistrum rugosum*), nabo (*Brassica* spp.), pasto bolita (*Cyperus rotundus*), rábano (*Raphanus* spp.), trébol de olor (*Melilotus*).

(4) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización del INASE.